





# Idegen testek lenyelése

A legtöbb kutya sajnos nagyon kíváncsi, és előszeretettel kóstolnak meg mindent, akkor is, ha az nem ehető. Így elég **gyakran találkozunk az állatorvosi rendelőkben a lenyelt tárgyak okozta bélelzáródással**. Sajnos ez legtöbb esetben csak műtéti, vagy endoszkópos úton orvosolható. Bizonyos esetekben a hánytatás is megoldás lehet, azonban ez függ a lenyelt tárgytól, és az eltelt időtől is. **Ha nem kerül a kutya időben állatorvoshoz, hashártyagyulladás, majd halál is bekövetkezhet.**

## Gyakori lenyelt idegen testek:








-  kavics
-  csont, vagy csont darabok,
-  gesztenye,
-  labda, játékdarab
-  fonál,
-  szalag,
-  zokni,
-  műbél,
-  barackmag,
-  csomagolóanyagok,
-  gyerekjátékok.



**Javasoljuk, hogy amennyire csak teheted, ezektől tartsd távol kedvencedet!  
Csak olyan játékot adj neki, amit biztosan nem tud lenyelni. Ha pedig elnyűtte a játékait, és azok elkezdtek darabokra esni, vegyél neki újat, nehogy egy-egy darabot megegyen belőle!**



### Milyen tünetekkel járhat az idegentest lenyelése?

-  Bágyadtság, elesettség, étvágytalanság,
-  Gyakori hányás
-  Bélsárürítés hiánya, vagy hasmenés
-  Hasi fájdalom jelei, hasi érzékenység
-  Nyálzás
-  Púposítás a hasi fájdalom miatt
-  Viselkedésváltozások: harapás vagy morgás, ha felemeljük, vagy a hasához érünk,

### Hogyan lehet diagnosztizálni a gyomor-bélrendszerbe került idegen testeket?

Ha felmerül az idegen test gyanúja, akkor röntgen- és/vagy ultrahang vizsgálatra van szükség. Amennyiben röntgennel nem kimutatható az idegen test, akkor kontrasztos röntgen készítésével lehet kimutatni az elzáródást, vagy a lenyelt tárgyat.

### Hogy lehet kezelni a bélrendszerbe jutott idegen testek okozta kórképeket?

Legtöbb esetben műtéti, vagy endoszkópos úton távolíthatóak el az idegentestek. Ilyenkor is versenyt futunk az idővel, minél hosszabb idő után kerül sor a beavatkozásra, annál nagyobb a műtéti kockázat!

Az idegen testek miatt kialakult részleges vagy teljes elzáródás rontja vagy megszüntetheti a szervek vérellátását. Így **akár már néhány óra alatt elhalhat a nyelőcső, gyomor vagy bélrendszer fala, súlyos esetben át is szakadhat**, és akár az állat életét is veszélyeztető állapot jöhet létre.

Szövődményként hashártyagyulladás, az ionháztartás felborulása, szeptikémia, szeptikus sokk, veseelégtelenség is kialakulhat.



### Hogyan tudod megelőzni az idegentest okozta bélelzáródást?

Érdemes **naponta többször mindent felszedni a földről, amit lenyelhet a kutya**, és persze ne olyan helyre vigyük póráz nélkül sétáltatni, ahol felehet szemetet, vagy különféle tárgyakat kedvencünk.

Ha látjuk, hogy lenyel valamit kutyusunk, akkor a legjobb, ha azonnal orvoshoz fordulunk.

**Minél előbb megyünk állatorvoshoz, annál nagyobb az esélye, hogy a probléma még orvosolható és nem alakul ki komolyabb szövődmény.**