

Gyakran előforduló betegségek

A nyulak rendkívül érzékeny állatok, de odafigyeléssel, jó takarmányozással, megfelelő tartástechnológiával, rendszeres oltásokkal elkerülhetünk sok betegséget.

Nagyon fontos, hogyha nyuszink viselkedésében változást észlelünk, pl.: bágyadtabb, kevesebbet eszik, azonnal forduljunk állatorvoshoz. Érzékenységük és kis termetük, gyors anyagcseréjük miatt tartalékaik pillanatok alatt eltűnnek és kifejezetten gyorsan súlyossá fordulhat állapotuk. Felépülésüket, betegségük kimenetelét kritikusan befolyásolja az idejében elkezdett kezelés.



1. Nyulak bélrendszeri pangása (gastrointestinalis sztázis)

Kiváltó okai:

takarmányváltás, utazással, új lakhellyel járó stressz, fájdalom, új családtag, időjárás változás és frontok

Mi történik?

A nyúl bélmozgása leáll, a nyuszi életveszélyes állapotba kerül. A bélben és a gyomorban pangó takarmány és az így termelődő gázok feszítik a bélfalat, amely erős hasi fájdalommal jár. A gyógyulás kulcsa az időben való felismerés!

Tünetek:

gubbasztás: a nyuszi nem mozog egy helyben „gubbaszt” (nem összekeverendő a pihenő pózokkal), sokszor a nyuszi hasán érezni hogy feszes, kemény, nem áttapintható a gázbuborékok miatt

étvágytalanság: a nyúl nem fogadja el a táplálékot, nem eszik semmit, a kedvenceit sem hajlandó megenni

nincs bélsár: a nyúl nem ürít bogyókat



Nyulak bélrendszeri pangása (gastrointestinalis sztázis)

Kezelése:

Azonnal orvoshoz kell vinni a nyuszit! Abban az esetben, ha nincs a közelben elérhető orvos, akkor a házipatikából a következők beadása javasolt, amíg nem kerül a nyuszi orvoshoz:


- Meloxidyl 1,5mg/ml adagolás: 0,4 ml/ttkg
- Espumisan 100mg/ml adagolás: 0,5 ml (10-12 csepp)/ttkg
- Rodicare akut (0,3 ml törpenyusziknak kb. 3 kg-ig)
- Biolapis: még orvos után is ajánlott adni pár napig (naponta max 1 tasaknyi, szerencsés több részletben beadni, a tasak negyedét pár ml vízben feloldani és fecskendővel beadni).

Fontos!

Az otthoni házipatika és gyógyszerbeadás **NEM** helyettesíti az állatorvost és a rendes kivizsgálást, valamint a rendelőben beadható gyógyszereket, infúziós terápiát!



2. Talpfekély



Kiváltó okai:

A genetika is szerepet játszik, vannak kimondottan hajlamos fajták, pl. rex. Kialakulás főbb okai lehetnek a rossz súlyelosztás, durva és/vagy kemény padló: kő, beton, de sokszor a járólap, ketrec kemény alja is kiválthatja. Valamint a ketrec rossz higiénája, a rendszeres takarítás hiánya.

Mi történik?

Romlik a talp vérkeringése, az oxigén csökkenése pedig a szövet elhalásához vezet. Fájdalmas nyomás alakul ki, ami először csak (szőr)kikopás formájában jelentkezik, aztán fekély, súlyos esetben tályog keletkezik.

Tünetek:

Egy piros, kopasz folttal kezdődik a talpon (legtöbbször a saroknál), bőr megvastagszik, begyullad. Ha kezeletlenül marad átterjedhet mélyebb szövetekre is, amennyiben bakteriális fertőzés is fennáll, fehér paszta szerű genny is tapasztalható, ekkor antibiotikumos kezelés is kell kísérőnek.



Talpfekély

Kezelése:

Ki kell deríteni az okot, és aszerint (is) kezelni. Ha túlsúly miatt van, diétáztatni kell a nyuszt, ha a tartási körülmények miatt, akkor azon kell javítani.

Legjobb, ha puha, egyenetlen talaj van biztosítva a nyuszinak.

Emellett szükséges a sebkezelés is: Betadine-os fertőtlenítés, majd hámosító krém használata a legjobb (Sudocream, Bepanthen), erre érdemes gézlapot tenni és áttekerni copoly-val legalább amíg a krém felszívódik hogy ne nyalja le a nyuszi. Súlyos esetben a kötésnek vastagnak és állandónak kell lennie.



3. Fogproblémák

Kiváltó okai:

genetikai probléma, helytelen táplálás, ketrec rágás/rángatás

Mi történik?

Nyuszi hátsó fogai nem érintkeznek egymással megfelelően rágás közben, így nem tudnak jól kopni. Elkezdnek csipkésedni, éles részei lesznek, amik felsértik belül a szájat, nyelvet. Ezáltal fájdalmassá válik a rágás, evés.

Tünetek:

szem könnyezése, fogyás (ezért is nagyon fontos a rendszeres súlymérés!), nyáladzás, lassú megfontolt evés vagy nem-evés, nem szénázás



Fogproblémák

Kezelése:

Abban az esetben, ha az állat már lefogyott, legyengült, először intenzív infúziós terápia és feltáplálás szükséges a kezelés megkezdése előtt, mivel minden fogászati ellenőrzést, beavatkozást bódításban végeznek.

Egy fogproblémás nyuszinak élete végéig rendszeres állatorvosi kontrollra és fogcsiszolásra van szüksége (általában 4-8 hetente kell). A rendszeres csiszolással viszont szépen szinten tartható az állapota és boldog életet élhet.

Fontos!

Semmiképpen se csípjuk, vágjuk otthon nyuszink fogát! A nyulak fogát kizárólag csiszolni szabad, különben sérülhet, megrepedhet a fog, ami foggyökértályoghoz vezethet.

A tályog kizárólag speciális altatásos műtéttel távolítható el, mert a kutyaikkal és a macskákkal ellentétben a nyulak szervezete rendkívül sűrű gennyes váladékot termel. Sajnos a tályog mindig visszatér (bár évekig tünetmentes maradhat a nyuszi), és a baktériumok még az állkapocs csontot is feloldhatják, így elkerülhetetlen a szakszerű orvosi ellátás.



4. Encephalitozoon cuniculi

Kiváltó okai:

Az Encephalitozoon cuniculi egy egysejtű gomba, ami a nyulak 80%-ában jelen van, de sok esetben nem okoz tüneteket.

Vizelettel, széklettel, gazdi ruháján megtelepedett kórokozókkal terjed több nyuszi esetén.

Tünetek:

Ferde fejtartás, önkéntelen szemmozgás, koordinációs problémák (körbe-körbe forog), egyensúly zavar: csetlik-botlik, esetenként talpra sem tud állni, lábak részleges vagy teljes bénulása, görcsös rohamok, hályog szerű folt a szemben

Mivel idegrendszeri tünetek nem csak ehhez a betegséghez kapcsolódnak, a parazita vérből való azonosítása szükséges a diagnózis felállításához. Viszont ez hosszú folyamat és megbetegedés esetén a percek is számítanak, így azonnal el kell kezdeni a kezelését.



Encephalitozoon cuniculi

Kezelése:

Első tünetek megjelenésekor azonnal fenbendazol tartalmú készítményt kell adni (pl. Ferdocat/Panacur paszta ami adható nyusziknak is): 25 mg/ttkg fenbendazol a hatásos dózis.

A lehető leggyorsabban orvoshoz kell mennünk!

A kezelést minimum 4 hétig folytatni kell.

Kiemelten fontos valamilyen immunerősítő (Vetri DMG vagy GladiatorPlus) adása is és fontos a környezetére is gondot fordítani. Nyugodt, csendes, nem túl világos helyen legyen, a mozgásteret legyen lekorlátozva és párnákkal, pokrócokkal kibélelve, hogy ne üthesse meg magát. Könnyen elérhető helyen, vele egy szinten legyen a víz és élelem. Szükség esetén kényszeretessük.

