

Egyéb egészségügyi esetek ellátása

Kullancs biztonságos eltávolítása:

Egy csipesz segítségével fogjuk meg a kullancsot olyan közel a kutya bőréhez, amilyen közel csak tudjuk! Vigyázzunk, hogy a kullancsot ne nyomjuk össze a csipessel, próbáljuk csak a feji részét megfogni! Majd miközben húzzuk, óvatos csavaró mozdulatot végezzünk.










A kullancs eltávolítása után a helyét betadine oldattal kenjük be. Jelezzük a gazdinak, és ha kéri akkor a kullancsot küldessük be PCR vizsgálatra az állatorvossal. Javasoljuk a gazdinak a kullancs-bolha elleni védelem megújítását.

Csípések

Tünetek súlyosabb esetben anafilaxiás sokként is jelentkezhetnek!

Ha a kutya allergiás a méh csípésére, akkor súlyos tünetek, úgynevezett anafilaxiás sokk alakulhat ki.

Ennek jelei:

-  neheztett, szapora légzés,
-  szapora szívverés,
-  bedagad a nyelve, a torka, nem kap levegőt, nem tud nyelni, fullad (gégeödéma miatt),
-  légzéskor szokatlan, szörcsögő hangot ad ki (tüdőödéma),
-  hány, hasmenése van,
-  lázas,
-  izomfájdalma, izomgörcse van,
-  nehezen tud mozogni,
-  sápadt az ínye








Ha a fentiek közül bármelyik tünetet tapasztalod, sürgősen szakszerű ellátásra és kombinált kezelésre van szükség, tehát azonnal irány az állatorvos! Ne késlekedj, minden perc számít! Különösen veszélyes, ha például a méh vagy darázs szúrja meg a nyak, száj, nyelőcső területén.

Légy alapos! Kérdezd meg a gazdit, hogy a kutya védett-e kullancsok és bolhák ellen, mikor volt utoljára féreghajtva! Mindezzel nemcsak, hogy jó pontot szerezhetsz a gazdinál, de egyből megtudhatod azt is, veszélyes-e a kutyust védelem nélkül kullancsos helyen sétáltatnod, vagy más állatokkal összeengedned!





Kihűlés

Tünetek:





Kezdeti állapotban

-  levertség,
-  reszketés,
-  lelassult mozgás,
-  sápadt, színtelen íny,
-  csökkent éberség, tompultság.

Előrehaladott állapotban

-  kábultság,
-  lassú légzés,
-  alacsony vérnyomás,
-  merevvé válnak az izmok, már nem reszket.

Súlyos állapotban

-  halk szívverés,
-  sokkos állapot,
-  merev és tág pupillák,
-  nehézlégzés, kóma.



Mi a teendő kihűlés esetén?

1. Vidd be azonnal kutyát egy **meleg helyiségbe**. Szüntesd meg a lehűlést okozó körülményeket!
2. Ha sokkos állapotban van, enyhítsd haladéktalanul a tüneteket (lásd: sokk)!
3. Szárítsd meg törülközővel (ha az átázott, azonnal cseréld ki)! Amint a kutya megszáradt, tekerd körbe 2-3 száraz törülközővel vagy pléddel, hogy lassan, egyenletesen melegedjen fel!
4. Húzz a lábaira zoknit - fontos a **lábvégek felmelegítése!**
5. Hajszárítóval, melegítőpárnával segítheted a kutya testhőjének emelkedését!
6. Ilyenkor a fő cél, hogy a végbélben mért hőmérsékletet minimum **37,0 C° fölé tornásszuk fel!**








Ne tegyél a kutyára semmilyen forró dolgot, és semmiképpen ne helyezd meleg vizes fürdőbe!



Hőguta

Ha meleg a külső hőmérséklet, SOHA ne hagyd a kutyát a kocsiban, még néhány percre sem! Az autó pillanatok alatt felforrósodik, az állatok pedig nagyon könnyen hőgutát kapnak.

Tünetek:

-  gyors, erőteljes lihegés, nehézlégzés, szörcsögő hang, megvastagodott, ragadós nyál, szájhabszás, habos orrváladék,
-  40 °C feletti testhőmérséklet,
-  tág pupillák,
-  duzzadt, lilás nyelv, a szájnyálkahártya vörös, szürkés árnyalatú,
-  szapora szívverés,
-  hányás, hasmenés,
-  imbolgó járás, roham, sokk, megmerevedés, eszméletvesztés, kóma.

Mi a teendő hőguta esetén?

Ha egyértelműen túlhevült, akkor azonnal kezd meg a kutya lehűtését, még mielőtt orvoshoz viszed.

1. Vidd gyorsan árnyékos helyre vagy hűvös (18-20 °C-os) helyiségbe.
2. Ha sokkos állapotba került, haladéktalanul enyhítsd a tüneteket (lásd: sokk). Ha nincs sokkos állapotban, adhatsz, csapvíz hőmérsékletű vizet (inkább többször, keveset). Ha nem akar inni, akkor ne erőltesd, és ne öntsd a szájába, mert félrenyelhet! Inkább nedvesítsd meg a nyelvét, száját, fülét és lábvégeit vizes szivaccsal.
3. Itass át egy (vagy több) törülközőt vagy lepedőt csapvízzel, és terítsd rá úgy, hogy érintse a nyakát (a füleit hagyd szabadon), a hónalját, a lágyékát, és a hasát. A végtagjait is csavard be nedves ruhával. A lehűtésére használt törülközőt vagy lepedőt cseréld gyakran.



4. Ne locsold jéghideg vízzel, rakd hideg vizes kádba/medencébe és ne tegyél jeget a kutyára! A túl drasztikus hűtés eredményeként megállhat a szíve!

5. Mérd meg a testhőmérsékletét 5 percenként végbélén keresztül. Abban a pillanatban, ahogy elérte a 39,5 °C-ot, hagy abba a hűtést. (Ha nincs nálad lázmérő, akkor, ha azt látod, hogy a kutya jobban van, kifejezőbb a tekintete, érdeklődő, esetleg lábra áll, nem remeg a lába, abbahagyhatod a hűtést.)

6. Ezután azonnal vidd az orvoshoz. Szállításnál beteheted lehűtött autóba, de ügyelj arra, hogy 20-22 °C-nál ne legyen bent hűvösebb.

Az orvosi megfigyelés mindenképpen fontos még a későbbiekben is, mert a túlhevülés komplikációkkal járhat!

Amit tenni tudsz, ha már megtörtént a baj:


- ✔ Hidegvizes törölközővel tekerjük be az állat testét!
- ✔ Kerüljük a direkt napfényt, tartsuk árnyas, hűvös helyen az állatot!
- ✔ Pár percenként nedvesítsük újra a törölközőt, ha az átmelegedett!
- ✔ Amilyen gyorsan csak lehet, szállítsuk állatorvoshoz





Vércukorszint leesése:


Kistestű kutyában:

 Mivel testméretüknél fogva kevés szénhidrátot raktároznak, ha hirtelen megerőltetés vagy hosszabb játék során megnő a szervezet szénhidrát igénye, nem tud a raktárakból elegendőt felszabadítani, így leesik a vércukorszintjük. Ekkor gyorsan méz vagy cukor oldat szájnyálkahártyára kenésével orvosolhatjuk a problémát. Stressz, hányás, hasmenés is okozhat náluk vércukor esést.

 A tartósan alacsony vércukorszint görcsökhöz, kómához vezethet!


Kölyök kutyákban:

 Súlyos parazitás fertőzöttség, valamint helytelen táplálás okozhatja.

 Szintén méz vagy cukoroldat adásával/ínyre kenésével kezeljük.


 Kistestű kölyökkutyákban különösen gyakran előfordulhat.


Cukorbeteg kutyában inzulin túladagolás miatt:

 Akkor fordulhat elő, ha nem eszik, vagy hány inzulinadagolás mellett, esetleg túladagoltuk az előírt inzulin adagját.

 Fontos, hogy az inzulin beadás előtt etessük meg a kutyát!

 Ha hányt, vagy nem eszi meg az ételét, csak az inzulin adagja felét adjuk be!

 Kenjünk mézet a szájnyálkahártyára!

 Ha többször is előfordul hányás vagy étvágytalanság, konzultáljunk a gazdival, és vigyük állatorvoshoz a kutyát!