



# Epilepszia


Mivel viszonylag gyakori a kutyák körében, fontos említést tennünk erről a betegségről. Vannak erősen érintett fajták, akik között nagyobb arányban fordul elő, ilyenek a tacsó, németjuhász, uszár, magyar vizsla, border collie. Az időjárási frontoknak erős hatása van az epilepsziás roham kialakulására, így ekkor fokozottan figyelni kell.

## Az epilepszia egy visszatérő, átmeneti agyi rendellenesség.

### A rohamnak 3 szakasza van:

** Bevezető szakasz:** Általában szinte észrevétlenül rövid ideig tart. A tünetek változatosak lehetnek: nyugtalanság, félnkség, remegés, bevizelés, védelem keresése, nyálzás, merev tekintet. Néha előfordulhat, hogy észlelhető előzmény nélkül kezdődik az epilepsziás görcs.

** Görcsroham:** A végtagizmok és a fej izomgörcse, a kutya az oldalán fekvő úszómozgásokat végez (lehet futómozgás-szerű rángatózás, ritmikus rángógörcs vagy merevgörcs), gyakran öntudatvesztéssel jár együtt.

** Roham utáni állapot:** Néhány perctől akár több óráig is tarthat ez a szakasz, jellemző a mozgáskoordináció zavara, viselkedésváltozás (időnként akár agresszió is!), zavartság és átmeneti vakság is előfordulhat. A görcsroham után a kutya percek alatt tünetmentessé válhat, de hosszabb ideig is zavart állapotban maradhat. Veszélyes állapot, maradandó agykárosodást, halált is okozhat.

**A roham időtartama általában 1-5 perc.** A kutya az oldalán fekszik, fejét hátra feszíti, akár a végtagok futómozgásszerű rángásai, görcsei láthatók. Az esetek nagy részében a beteg tudatát elveszti, szólításra nem reagál. Fontos, hogy a roham alatt és után tartsuk az állatot meleg, csendes, puha helyen. Ne hagyjuk kemény padlón rohamozni a kutyát, mert megsérülhet a túl erős rángások közepette! Beszéljünk a tulajdonossal, ha szükséges, a kezelőállatorvossal is. Ha ismerten epilepsziás kutyára vigyázol, akkor szükség lehet nagyroham esetén egy Diazepam végbéloldat beadására is.