





Tápváltások menedzselése

Természetesen nagyon fontos, hogy a gazdival egyeztetve legyen minden részlet, és a kutya megszokott etetési rendje legyen betartva a szittelés során. Ne legyen változtatás sem a táp minőségében, sem az etetési időpontokban, ugyanis ezek mind emésztési zavarokat okozhatnak!

Ha a gazdi épp tápváltást tervezne, akkor kérd meg, hogy ne az elutazás idejére időzítse azt. Ha elkerülhetetlen, hogy ilyenkor legyen a tápváltás, akkor fontos, hogy csak fokozatosan, nagyjából egy hét leforgása alatt térjünk át teljes mértékben az új tápra!

A fokozatos tápváltás

Kövesd az alábbi lépéseket, hogy zökkenőmentes legyen a tápváltás:

-  **1-2. nap:** 25% az új eleségből és 75% a régi étrend szerint. hogy az állat bélflórája hozzászokhasson a változásokhoz.
-  **3-4. nap:** 50% az új eleségből és 50% a régi étrend szerintiből.
-  **5-6. nap:** 75% az új eleségből és 25% a régi étrend szerintiből.
-  **7. nap:** 100%-ban adható az új eleség.

Ebben a hét napban javasolt kutyáknak való probiotikumok adása is, ezzel jelentősen csökkenthető a tápváltás miatti emésztési problémák kialakulásának valószínűsége!



Gyakorlati tippek a helyes tápláláshoz

- ✓ Ha a gazdi távol van pár napra, előfordulhat, hogy nem hajlandó enni a kutya az első napokban – főleg ha ez az első hosszabb távollét. Szorongást, stresszt válthat ki belőle egy új személy, valamint a gazdi(k) hiányának együttese. Ez teljesen természetes.

Bevethetsz ilyenkor trükköket a gazdi engedélyével, mint egy finom húsleves, vagy főtt hús, vagy bármivel, ami a kutya kedvence. Fontos, hogy mindez a megszokott etetési időpontban történjen, ne próbáld óránként étellel kínálni.

Általában 1-2 nap étvágytalanság után, ha kezdi elfogadni az új helyzetet, visszatér majd az eredeti étvágya.

Ha az étvágytalanság 1-2 napnál tovább is fennáll, esetleg hányás, hasmenés, hőemelkedés kíséri, vagy a kutya nem ürít, ne habozzunk állatorvoshoz fordulni!

- ✓ Sohase adjunk a kutyának egyszerre túl nagy mennyiségű táplálékot!
- ✓ Etetés után 2 órán át ne legyen erőteljes mozgás, ugrálás, futás vagy játék!
- ✓ Ne etessük csonttal a kutyát! Lehet, hogy a gazdi szokott neki csontot adni, azonban azt javasoljuk, hogy abban a pár napban, míg rád van bízva a kutya, inkább kerülj a csont etetését a biztonság kedvéért.

Már önmagában bármilyen csont könnyen bélsárrekedést okozhat, a csöves szerkezetű baromficsont (szárny-, comb- és lábszárcsont), viszont szilánkosan törik, így mechanikus sérülést is okozhat akár szájüregben, akár az emésztőcsatorna bármely szakaszán.



Gyakorlati tippek a helyes tápláláshoz

- ✓ Az állatorvosi rendelőkben rendszeresen találkozunk bélcsatornában vagy gyomorszájban elakadt csonttal, esetleg a szilánkos csont által átfúrt bélszakasszal, melyek műtéti úton orvosolható életveszélyes helyzetek. Jobb az ilyen baleseteket megelőzni! A kutya ki fog bírni pár csontmentes napot, ezért a biztonság kedvéért inkább kerülj a csonttal való etetést. Alternatíva lehet a nagy méretű rágócsont, azonban az ebből leharapott darabokat célszerű elvenni a kutyától, mielőtt lenyelné azokat.
- ✓ Víz mindig korlátlanul álljon a kutya rendelkezésére. Itatás előtt fontos, hogy a kutya futtatás vagy kimerítő játék miatti megemelkedett légzésszáma normalizálódjon, felhevült teste visszahűljön. Gyakori hiba, hogy az itatott víz túlságosan hideg, ilyenkor könnyen torokgyulladást kaphat a kutya, így erre is ügyelni kell.
- ✓ Ne nasiztassuk a kutyát! Egy chips vagy más emberi nassolnivaló nem tesz jót az állatnak, ráadásul sokszor hasmenést is okozhat! Ez a gazdi szemében is rossz fényt vet ránk!

